

**Інформація
про стан посівів цукрових буряків станом на 17 серпня 2015 р.**

Площа посіву цукрових буряків в 2015 році становить 237 тис. га, що на 93 тис.га менше, ніж в минулому році.

Станом на 17 серпня середня маса 1 коренеплоду була в межах 380 г, що на 52,8 г менше ніж в 2014 році.

За станом на 10 серпня в усіх областях відмічено зменшення маси гички однієї рослини і на 17 серпня вона становила 325 г, тоді як в минулому році цей показник був 430 г, або на 105 г менше.

Суттєва втрата маси рослин, перш за все, пояснюється пізнішими строками посіву цукрових буряків, а також високими температурами, що спостерігаються впродовж значного періоду, особливо в липні-серпні, що призвело до суттєвого зменшення запасу вологи в метровому шарі ґрунту. Так, за даними Уладово-Люлинецької ДСС запаси вологи в метровому шарі дорівнюють 20 мм при оптимумі 160 мм, що, звичайно, призведе до зменшення урожаю (табл. 1).

Таблиця 1

Вплив засухи на продуктивність цукрових буряків

Показники	Оптимальна волога протягом всього періоду вегетації	При 3-х тижневій засусі			
		червень	липень	серпень	вересень
Маса 1-го коренеплоду, г	735	512	337	462	471
Цукристість, %	16,5	14,7	13,9	12,7	18,6

Враховуючи факт достатньої густоти рослин (в межах 100 тис.шт. на 1 га), при наявності опадів можливий певний приріст коренеплодів у вересні, тому початок збирання цукрових буряків у цьому році бажано відтермінувати до початку жовтня (табл. 2)

Таблиця 2

Продуктивність цукрових буряків залежно від строків збирання

Дата збирання	Маса одного корене-плodu, г	Урожай-ність, т/га	Приріст урожаю, т/га	Цукри-стість, %	Збір цукру з 1 га/т	Приріс збору цукру, т/га	Вміст сухих речовин, %	Збір сухих речовин з 1 га/т	Приріст збору сухої речовини, т/га	Вміст нецукрів, %	Збір нецукрів, т/га
15.09	542,2	45,5	-	17,10	7,8	-	22,8	10,4	-	5,7	2,6
04.10	708,0	56,6	11,1	17,86	10,1	2,3	23,0	13,0	2,6	5,1	2,9